

دستور العمل فنی تغذیه باغهای زیتون

۱- محلولپاشی تشکیل میوه (fruit set) :
در باغهای بارده برای افزایش درصد بارآوری، تشکیل میوه و جلوگیری از ریزش گلها حتماً لازم است هر سال دو بار محلول کودی زیر محلولپاشی شود.

بار اول در شهریور یا آبان ماه پس از برداشت میوه باردوم در اسفند ماه و بهنگام تورم جوانه
۲ ن اوره 2 در هزار+ سولفات روی 2 در هزار+ اسید بوریک 5 در هزار
لازم به ذکر است که تجویز عنصر بر برای درخت زیتون به دلیل حساسیت درخت و ایجاد برگ سوزی منوط به آزمایش آب و عدم وجود سمیت بر در آن مخصوصاً در خاکهای شور و رعایت نکات لازم هنگام محلولپاشی از جمله زمان مناسب محلولپاشی، آبیاری باغ قبل از محلولپاشی، استفاده از مواد مویان و ... طبق نظرات کارشناسان می باشد.

۲- تغذیه درختان بصورت چالکود:
به منظور افزایش توان مصرفی درخت و سهولت در دسترسی عناصر مورد نیاز در باغهای میوه، استفاده از روش تغذیه چالکود توصیه می گردد که مقادیر مصرفی کودها در این روش تغذیه به عوامل مختلف از جمله نتایج آزمون خاک و تجزیه برگ، سیستم آبیاری ، بافت خاک، سن درخت، و... بستگی دارد ولی عموماً فرمول کودی زیر برای درختان زیتون یک باغ بارور به شرح زیر پیشنهاد می گردد.

۲ ن 500 گرم نیتروژن به ازاء هر درخت از منبع اوره یا نترات آمونیم.

۲ ن 250 گرم فسفر به ازاء هر درخت از منبع سوپر فسفات یا فسفات آمونیم.

۲ ن 500 گرم پتاسیم به ازاء هر درخت از منبع سولفات پتاسیم

۲ ن 100 گرم آهن به ازاء هر درخت از منبع سولفات آهن

۲ ن 150 گرم گوگرد به ازاء هر درخت (در خاکهای با PH بالای 8)

۲ ن کود دامی کاملاً پوسیده 30 کیلوگرم

زمان مناسب اجرای چالکود:

۲ ن کودهای فسفر، پتاسیم ، آهن و گوگرد در فصل پاییز

۲ ن کودهای ازته در دو مرحله یکی در فصل پاییز همراه سایر کودها و یکی از اوایل تابستان

میباشد.س.11/21